

# Protocole de suivi de l'avifaune des étangs forestiers de Rambouillet

## Sites

Les sites concernés par ce suivi sont les étangs de Coupe-Gorge, du Gruyer, du Moulinet et de la Grenouillère.

Des quatre étangs, seul le Moulinet est en eau et pourra servir de site témoin.

## Espèces

L'effort va porter sur les oiseaux d'eau avec un suivi de la nidification et de l'hivernage.

Les espèces nicheuses potentielles :

- Grèbe castagneux,
- Grèbe huppé,
- Canard colvert,
- Canard mandarin,
- Gallinule poule-d'eau,
- Foulque macroule,
- Martin-pêcheur d'Europe,
- Bergeronnette des ruisseaux,
- Bergeronnette grise.

Pour ces espèces, il faut déterminer le nombre de couples cantonnés et tenter de relever des indices de nidification (nids, nichées, becquées).

Les autres espèces peuvent être comptées pour information.

L'avifaune hivernante sera comptée à la mi-janvier lors du weekend Wetlands International.

## Fréquence

Pour les nicheurs, une sortie mensuelle de mars à juillet avec au moins deux semaines d'intervalle entre deux sorties.

Pour les hivernants, un passage à la mi-janvier.

## Durée d'une sortie

Au moins 20 minutes par étang.

## Durée de l'étude

Jusqu'à la remise en eau des étangs, ce qui pourrait durer plusieurs années.

## Retour des données

A saisir sur faune-france et/ou à envoyer par courriel à christianletourneau@numericable.fr